

Диагностические критерии регистра Саймона Брума

Определенный диагноз геСГХС ставится, если:

OXC > 6,7 ммоль/л или XC ЛНП \geqslant 4,0 ммоль/л у пациента младше 16 лет,

<u>или</u>

ОХС >7,5 ммоль/л или ХС ЛНП \geqslant 4,9 ммоль/л у пациента старше 16 лет

Плюс одно из нижеперечисленного:

• наличие сухожильных ксантом у пациента или родственника 1-й степени родства (родители, дети, братья, сестры) или у родственника 2-й степени родства (дедушки, бабушки, дяди или тети);

и/или

позитивный тест ДНК-диагностики, подтверждающий наличие патогенного или вероятно патогенного варианта нуклеотидной последовательности в генах LDLR, APOB или PCSK9

Вероятный диагноз геСГХС ставится, если:

OXC > 6,7 ммоль/л или XC ЛНП \geq 4,0 ммоль/л у пациента младше 16 лет;

<u>или</u>

OXC > 7,5 ммоль/л или XC ЛНП \geq 4,9 ммоль/л у пациента старше 16 лет

Плюс одно из нижеперечисленного:

• наличие ИМ в анамнезе родственника 2-й степени родства до 50 лет, родственника 1-й степени родства — до 60 лет;

и/или

OXC > 7,5 ммоль/л у пациента старше 16 лет 1-й или 2-й степени родства или повышение OXC > 6,7 ммоль/л у пациента или родственника 1-й степени родства в возрасте младше 16 лет

Источники

1. Клинические рекомендации "Нарушения липидного обмена". Одобрено Научно-практическим Советом МЗ РФ. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/752_1 (дата доступа 03.04.2023).



