

Критерии оценки качества медицинской помощи

Критерии	Класс и уровень	УДД	УУР	Выполнение критерия
1. У лиц старше 40 лет выполнено лабораторное исследование уровня холестерина и ХС ЛНП	IC	C	1	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
2. У пациентов при высоких триглицеридах, СД, ожирении, метаболическом синдроме или очень низком ХС ЛНП проведена лабораторная оценка ХС неЛВП	IC	C	1	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
3. У всех бессимптомных взрослых старше 40 лет, без ССЗ, СД, ХБП, СГХС, с ХС ЛНП < 4,9 ммоль/л выполнена оценка общего риска с использованием шкалы SCORE2	IC	C	5	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
4. Выполнен сбор анамнеза о наличии у пациента ИБС, АГ, СД, атеросклероза периферических артерий, СГХС, МС, ожирения, хронических заболеваний почек	IC	C	5	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
5. Проведено физикальное обследование на предмет выявления кожных и сухожильных ксантом, ксантелазм и липоидной дуги роговицы	IC	C	5	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
6. Ультразвуковое исследование сонных и бедренных артерий с целью выявления АСБ	IIaB	A	2	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
7. В качестве стартовой терапии пациенту с установленным нарушением липидного обмена назначена терапия статином в дозовом режиме, достаточном для достижения целевого уровня ХС ЛНП	IA	A	1	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
8. При отсутствии целевого уровня ХС ЛНП на фоне максимально переносимых доз статинов через 8±4 нед. к терапии добавлен эзетимиб или алирокумаб/эволокумаб/ инклисиран (у пациентов очень высокого риска)	IB	B	2	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
9. При отсутствии целевого уровня ХС ЛНП на фоне максимально переносимых доз статинов и эзетимиба через 8±4 нед. к терапии добавлен алирокумаб/эволокумаб/инклисиран	IB	A	1	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
10. Достигнут целевой уровень ХС ЛНП < 1,8 ммоль/л (или его снижение по меньшей мере на 50% от исходного) у пациентов высокого риска через 8±4 нед. терапии	IA	A	1	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
11. Достигнут целевой уровень ХС ЛНП < 1,4 ммоль/л (или его снижение по меньшей мере на 50% от исходного) у пациентов очень высокого риска (кроме пациентов с СГХС) через 8±4 нед. терапии	IC	C	1	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Источники

1. Клинические рекомендации "Нарушения липидного обмена". Одобрено Научно-практическим советом МЗ РФ.
URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/752_1 (дата доступа 03.04.2023).